


# Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau  
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



**Obstbau**

Nr. 34

Freitag, 05.07.2024

**Entwicklungsstadium/Witterung:** Das Wetter im Gebiet bleibt unbeständig. Für Samstagnachmittag, Sonntag und kommenden Mittwoch sind Niederschläge gemeldet. Dazwischen soll es, nach heutigem Stand, trocken sein.

## Kernobst

**Schorf/Mehltau:** Allgemein sind die meisten Anlagen schorffrei. Allerdings zeigen die befallenen Bestände einen deutlich höheren Schorfdruck als in den Vorjahren. Die häufigen und teilweise heftigen Niederschläge bieten ideale Bedingungen für den Schorf um sich in den befallenen Anlagen weiter auszubreiten. In diesen Anlagen ist in einem ca. 7 - tägigem Abstand oder nach ca. 25 mm Niederschlag die Belagererneuerung durchzuführen. In schorffreien Anlagen kann das Spritzintervall auf ca. 10 – 14 Tage bzw. auf ca. 30 – 35 mm Niederschlag erhöht werden. Verwenden Sie ein Captan- oder Dithianon-haltiges Fungizid, bis zum Triebschluss unter Zusatz eines Mehlaufungizides wie z. B. Topas (0,125 l/ha/m; max. 3x/Saison; bis max. 30 Tage vor der Ernte). Beachten Sie die erhöhte Wartezeit von Delan WG auf 42 Tage!

Die Allgemeinverfügung „Captan-Hopfen“ wurde erlassen und **gilt ab heute**, dem 05. Juli, bis zum 30. September 2024. Zusätzliche Informationen folgen heute in einem Info-Schreiben.

**Apfelwickler:** Die Fangzahlen der Pheromonfallen sind weiterhin niedrig. Führen Sie trotzdem ergänzende Behandlungen mit Viruspräparaten wie z.B. Carpovirusine EVO 2 oder Madex Max durch, vor allem in Anlagen mit hohem Befallsdruck oder in denen die Coragen Behandlung 2-3 Wochen zurückliegt.

**Gemeiner Birnenblattsauger:** In Anlagen mit Honigtaubildung bei trockener Witterung weiterhin Einsatz von Kumar (1,0 bis max. 1,5 kg/ha/m; solo einsetzen, nur auf das trockene Blatt, nicht bei Temperaturen > 30°). Nur bei bedeckter, kühler Witterung ist der Einsatz von Neudosan Neu (10 l/ha/m; 2%-ige Konzentration empfohlen, solo einsetzen, Spritzbrühe muss langsam antrocknen; Gebrauchsanleitung beachten) möglich.

**Obstbaumsppinnmilbe/Rostmilbe:** Siehe Warndienst Nr. 33 vom 27.06.2024

## Steinobst/Beerenobst

**KFF/KEF:** Die Fangzahlen und Eiablagen sind im Vergleich zur letzten Woche wieder leicht gestiegen. In zwei behandelten Brombeeranlagen wurden Eiablagen gefunden. Die restlichen behandelten und geschützten Bestände waren befallsfrei. Kontrollieren Sie Ihre eigenen Fallen und Früchte. **Befallene Sorten unbedingt komplett abernten!** Bei Befall eine Behandlung mit vorzugsweise Exirel (0,375 l/ha/m; max. 1-2x/Saison max. 1,0 l/ha; Art. 53; bienengefährlich!) durchführen. Weitere Informationen zur Behandlungsstrategie siehe Info-Schreiben Nr. 6 vom Samstag, 01.06.24.

## Veranstaltungshinweise

**KOBstbautag:** am Mittwoch, dem 10. Juli, findet der KOBstbautag direkt am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee statt.

**Applikationsworkshop:** am Mittwoch, dem 17. Juli, lädt das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) zu einem Applikationsworkshop beim Demonstrationsbetrieb Rauch, bei Überlingen, ein.

Informationen zum Programm entnehmen Sie dem Info-Schreiben „Veranstaltungshinweise Juli“ vom 26.06.2024. Für die bessere Planung möchten wir Sie bitten, sich formlos mit dem Stichwort „KOBstbautag“ oder „Applikation“ für die entsprechende Veranstaltung über [veranstaltungen@kob-bavendorf.de](mailto:veranstaltungen@kob-bavendorf.de) anzumelden.

Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis am KOB

Herr Haltmaier: 0751 7903 305 oder 0176 7276 8775

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.