




Pflanzenschutz - Fax Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 13

Donnerstag, 29.04.2021

Entwicklungsstand/Witterung: Lagen- und Sortenweise ist bei Zwetsche die Vollblüte überschritten. Die Kirschen stehen überwiegend in Vollblüte, frühe Sorten sind bereits am Abblühen. Bei Apfel ist überwiegend das Stadium BBCH 63 erreicht, späte Lagen sind in BBCH 61 - 63, frühe Sorten in Vollblüte. Bis in die nächste Woche sind Temperaturen um 15 °C gemeldet. Der aktuell leichte Regen soll nach Prognose bis Sonntag anhalten und in der Intensität zunehmen. Je nach Wettermodell können es am Sonntag über 30 mm sein. Am Freitag und Samstag sind Regenspauzen möglich. Am Samstag ist allerdings Wind prognostiziert, womit die Applikationsbedingungen ungünstiger sein werden.

Kernobst

Schorf: Lt. Prognosemodell sind wir noch in der Phase der maximalen Ascosporennachreife. Es besteht sehr hohe Schorfgefahr! In den Sporenfallen wurden heute bis 11.00 Uhr innerhalb weniger Stunden sehr hohe Sporenausstöße ausgezählt. Aktuell laufen schwere Schorfinfektionen auf! Im Laufe des heutigen Tages und in den Folgetagen werden erneut sehr viele Sporen erwartet, womit wir uns in der bedeutendsten Schorfinfektionsphase der Saison befinden.

Die Belagswirkung von gestern wird mit dem Zuwachs der nächsten Tage deutlich nachlassen. Nutzen Sie Regenspauzen für eine allgemeine Belagsauffrischung, um die gesamte Periode abdecken zu können. Lt. Prognose ist am morgigen Freitag ein längerer trockner Abschnitt ohne Wind gemeldet. Damit wären gute Bedingungen gegeben. Vorzugsweise Syllit (0,625 l/ha/m; max. 1x/Saison mit neuer, max. 5x/Saison mit alter Ware) verwenden. Damit ist zusätzlich auch der heutige Sporenflug nochmals abgesichert. Syllit kann auf das noch nasse Blatt appliziert werden. Sofern dann eine Abtrocknung möglich ist, ist eine volle Belagsbildung gegeben. Alternativ auch Einsatz von Sercadis (0,1 l/ha/m) in Tankmischung mit einem Captan-/ Dithianon-haltigem Produkt. In Kelch- und Kernhausfäuleanfälligen Sorten (u.a. *Cameo*, *Kanzi*, *Gala*) ist damit eine gute Wirkung auf verschiedene Erreger gegeben (u.a. *Alternaria*, *Fusarium*, *Neonectria*).

Sollte durchgehende Blattnässe mit nachfolgenden Regen vorherrschen, kann auch als Zwischenbehandlung Curatio (bis BBCH 69=Blühende; 8l/ha/m; max. 6x in dieser Anwendung) eingesetzt werden. Curatio zeigte in allen Versuchen keine phytotoxischen Reaktionen.

Allerdings ist bei durchgehender Blattnässe keine Belagsbildung gegeben. Zum Wochenwechsel ist eine weitere Behandlung einzuplanen.

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis

Tel.: 0751-7903-305 /-306; Mobil 0175-723 10 06 (Herr Trautmann); Fax 0751-7903-309, Warndiensttelefon: 01805-197 197 37 (Festnetzpreis 0,14 €/min; Mobilfunkpreise max. 0,42 €/min). Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Haftungsausschluss: Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.